

NOTFALLPLAN UNTERZUCKERUNG



Bitte Bild
einkleben

_____ hat Typ1-Diabetes und wird mit Insulin behandelt.

Symptome einer Unterzuckerung:

- Allgemeine Schwäche, Weinerlichkeit, Anhänglichkeit
- Unruhe, Reizbarkeit, Verwirrtheit
- Übelkeit, Erbrechen
- Schwitzen, schneller Herzschlag, Zittern
- Kopfschmerzen
- Denk- und Sprachstörungen
- Konzentrationsschwäche, Verwirrheitszustände
- Bewegungsstörungen



Sofort Trauben- oder Würfelzucker oder zuckerhaltiges Getränk geben, erst danach Blutzucker messen.

Was müssen Sie bei einer schweren Unterzuckerung mit Bewusstlosigkeit tun?

1. in stabile Seitenlage bringen
2. KEINE feste oder flüssige Nahrung einflößen (Erstickungsgefahr)
3. Glukagon-Spritze geben (Funktionsweise wird auf den Abbildungen im Deckel des Glukagon-Sets erklärt)
4. Notarzt rufen:
Telefon: _____
Diagnose: Schwere Unterzuckerung bei Diabetes
5. Ruhe bewahren, bleiben Sie bei dem Kind und warten Sie auf den Notarzt, der dem Kind sicher und schnell helfen kann.

Telefonnummern der Eltern:

Privat: _____

Mobil: _____

Arbeit: _____

Weitere Hilfsmaßnahmen und Besonderheiten, die mit den Eltern besprochen wurden:

